



fichas de Trabajo

MATEMÁTICA

TABLA DE FRECUENCIAS

5^{to}

SECUNDARIA

Tabla de frecuencias de una variable continua (agrupación en intervalos)

Es aquella tabla en la que los datos originales se clasifican en intervalos de clase. La razón de la agrupación por intervalos de clase es el gran número de datos.

Ejemplo:

En una posta médica de Lima, se observa que en el presente mes se ha atendido un grupo de 1200 personas de las cuales hemos recopilado una muestra de 20 edades, las cuales mostramos a continuación:

10; 12; 09; 02; 15; 17; 18; 20; 22; 25; 25; 26; 27; 27; 32; 27; 42; 38; 33 y 34

a. Rango o recorrido (R)

Es la diferencia entre el mayor ($x_{\text{máx.}}$) y el menor ($x_{\text{mín.}}$) de los datos de la variable.

Del ejemplo: el rango es $R = 42 - 2 = 40$

b. Número de intervalos de clase (k)

Es el número de categorías o intervalos en que se va a dividir la información.

Regla de Sturges

$$k = 1 + 3,322 \log n$$

(n: número de datos)

Del ejemplo: $k = 1 + 3,322 \log 20 = 5,32$

si $k = 5,32$, se recomienda tomar 5 intervalos o un valor cercano que podría ser 4 o 6.

c. Amplitud o ancho de clase (w)

Es la diferencia entre el límite superior e inferior de cada intervalo.

Del ejemplo: la amplitud de cada clase será:

$$w = \frac{R}{k} \Rightarrow w = \frac{40}{5} = 8$$

o sea: $I_1 = [02 - 10); 10 - 02 = 8$

d. Marca de clase (x_i)

Es el punto medio de cada intervalo:

$$x_i = \frac{(\text{Límite inferior}) + (\text{Límite superior})}{2}$$

Del ejemplo: $x_1 = \frac{2+10}{2} = 6$

e. Las frecuencias absolutas y relativas

Se siguen los mismos procedimientos del tema anterior.

Por lo tanto, resumiendo los datos en una tabla:

Edades	X_i	f_i	F_i	h_i	H_i
[02 - 10)	6	2	2	0,10	0,10
[10 - 18)	14	4	6	0,20	0,30
[18 - 26)	22	5	11	0,25	0,55
[26 - 34)	30	6	17	0,30	0,85
[34 - 42)	38	3	20	0,15	1

$$n=20$$

$$1,00$$

Observación: $H = \frac{f}{n} \Rightarrow h_i = \frac{2}{20} = 0,10$

Medidas de tendencia central

(Para datos agrupados)

a. Media ($\bar{x}$)

$$\bar{x} = \frac{x_1 \cdot f_1 + x_2 \cdot f_2 + \dots + x_n \cdot f_n}{n}$$

b. Mediana (Me)

$$Me = L_{me} + \frac{\left(\frac{n}{2} - F_{me-1}\right)}{f_{me}} \times w$$

Donde:

L_{me} : Límite inferior de la clase mediana

w: Número total de datos

F_{me-1} : Frecuencia absoluta de la clase mediana

c. Moda (Mo)

$$Mo = L_{mo} + \left(\frac{d_1}{d_1 + d_2} \right) \times w$$

Donde:

L_{mo} : Límite inferior de la clase modal

w: Ancho de la clase modal

d_1 : Diferencia entre la frecuencia de la clase modal y de la clase anterior

d_2 : Diferencia entre la frecuencia de la clase modal y de la clase posterior

Ejemplo:

Dada la siguiente tabla de distribución de frecuencias. Calcula $\bar{x}$, Me, Mo.

Edades	X_i	f	F_i
[6 - 10)	8	6	6
[10 - 14)	12	7	13
[14 - 18)	16	8	21
[18 - 22)	20	4	25
[22 - 26)	24	12	37
[26 - 30)	28	13	40

$w = 4$
 $L_{me} \rightarrow$ [14 - 18)
 $L_{mo} \rightarrow$ [22 - 26)
 Para ubicar Me
 $f_{me-1} = 21$
 $d_1 = 12 - 4 = 8$
 $d_2 = 12 - 3 = 9$
 Para ubicar Mo

a) $\bar{x} = \frac{8 \cdot 6 + 12 \cdot 7 + 16 \cdot 8 + 20 \cdot 4 + 24 \cdot 12 + 28 \cdot 3}{40} = 17,8$

b) $Me = 14 + \left(\frac{\frac{40}{2} - 13}{8} \right) \times 4 = 14 + 3,5 = 17,5$

c) $Mo = 22 + \left(\frac{8}{8 + 9} \right) \times 4 = 22 + 1,88 = 23,88$

$\therefore \bar{x} = 17,8$

$Me = 17,5$

$Mo = 23,88$

• Esquema Formulario

Tabla de frecuencia de una variable continua

Agrupación en intervalos

Sueldo (soles)	Marca de clase X_i	f_i	F_i	h_i	H_i
$[a; b)$	$\frac{a+b}{2}$	Frecuencia absoluta	Frecuencia absoluta acumulada	Frecuencia relativa	Frecuencia relativa acumulada
$[b; c)$	$\frac{b+c}{2}$				

Total de
participantes

$n = ?$

$$h_i = \frac{f_i}{n}$$

Medidas de tendencia central
(Para datos agrupados)

Media	Mediana	Moda
$\bar{X} = \frac{\sum_{i=1}^n x_i \cdot f_i}{n}$	$Me = L_{me} + \frac{\left(\frac{n}{2} - F_{me-1}\right)}{f_{me}} \times w$	$Mo = L_{mo} + \left(\frac{d_1}{d_1 + d_2}\right) \times w$

• Trabajando en Clase

Nivel I

Enunciado

Se muestra la siguiente tabla de distribución de los trabajadores de acuerdo con los años de servicio en una empresa:

Año de servicio	Números de personas	F	h
[0; 5)	10	a	p
[5; 10)	5	b	q
[10; 15)	20	c	r
[15; 20)	15	50	s

1. Calcula el valor de $a + b + c$.
2. Calcula $p + q + r$.
3. ¿Qué porcentaje de los trabajadores tiene 10 o más años de servicio?

Nivel II

4. En la siguiente tabla de distribución de frecuencias:

I_i	X_i	f_i
[5 - 15)	10	6
[15 - 25)	20	4
[25 - 35)	30	3
[35 - 45)	40	7


Calcula $\bar{x}$.

5. En la siguiente tabla de distribución de frecuencias:

I_i	X_i	f_i
[15 - 25)	20	8
[25 - 35)	30	3
[35 - 45)	40	4
[45 - 55)	50	5

Calcula $\bar{x}$

6. El gráfico muestra los ingresos y egresos de una compañía durante cuatro años consecutivos:



¿Cuáles de las siguientes afirmaciones son verdaderas?

- La ganancia obtenida en 1999 es la misma que la obtenida en 2000. ()
 - Los egresos aumentaron porcentualmente de 1999 a 2000 en un 100%. ()
 - Los ingresos decrecieron porcentualmente de 1998 en un 66,7%. ()
7. El siguiente cuadro muestra los ingresos semanales de un grupo de trabajadores de la empresa Santiago Export S.A.

Salarios	f_i	F_i	h_i	H_i
[300 - 350)	24			
[350 - 400)				0,34
[400 - 450)	30			
[450 - 500)			0,12	
[500 - 550)				

$n = 100$

Determina el valor de:

$$f_5 + F_3 + h_2 + H_4$$

Nivel III

8. La siguiente tabla corresponde a la distribución del número de pacientes atendidos en enero de 1998 por 75 puestos de salud en la sierra. Las anchuras de clase son iguales.

Ii	Marca de clase (Xi)	# de puestos fi	Fi	hi
[20; a >	30			0,04
[; >			12	
[; >		15		
[; >		21		
[; >		12		
[; >		9		
[; >				

Total n = 75

Completa y calcula:
 $x_4 + f_2 + F_6 + h_5$

9. La siguiente tabla corresponde a la distribución de número de pacientes atendidos en marzo de 1999 por 80 puestos de salud en la selva. Las anchuras de clase son iguales.

Completa y calcula:

Ii	Marca de clase (Xi)	# de puestos fi	Fi	hi
[10; c >	30			0,15
[; >			18	
[; >		16		
[; >		20		
[; >		12		
[; >		4		
[; 150 >				

Total n = 80

$X_5 + f_7 + h_4 + F_6$

10. De la siguiente tabla de distribución calcula $F_2 + w$ (w: ancho de la clase común).

Clases	X	fi	Fi	hi	Hi
[10 - >				0,1	
[- >					
[- >				0,3	
[- >		25			0,8
[- 60 >		30			

11. Construye una tabla de distribución de frecuencia con 5 intervalos de clase de ancho común, teniendo en cuenta:

$$f_1 = 15 = f_5$$

$$h_2 = h_4$$

$$h_5 = 0,15$$

$$H_3 = 0,73$$

$$X_3 = 63 = x_2 + 30$$

Determina $\bar{x}$.

12. Dada la siguiente distribución de frecuencias, calcula la mediana.

Ii	fi	Fi
[10; 20 >	10	
[20; 30 >	12	
[30; 40 >	8	
[40; 50 >	20	

Tarea domiciliaria N° 9

Enunciado

Distribución de los trabajadores de acuerdo con las áreas de servicio en una empresa:

Años de servicio	Número de personas	Fi	hi
[0; 5)	24	a	m
[5; 10)	16	b	n
[10; 15)	32	c	p
[15; 20)	8	80	q

1. Calcula el valor de $a + b + c$.

- a) 130 b) 136 c) 156
d) 132 e) 146

2. Calcula $m + n + q$.

- a) 0,6 b) 0,8 c) 0,5
d) 0,4 e) 0,9

3. ¿Qué porcentaje de los trabajadores tiene 5 o más años de servicio?


- a) 75% b) 50% c) 70%
d) 80% e) 60%

4. De la siguiente tabla de distribución. Calcula $F_3 + w$ (w : ancho de clase común).

Clases	x	fi	Fi	hi	Hi
[20 - >)				0,12	
[- >)					
[- >)				0,36	
[- >)		60			0,85
[- 120)		45			

- a) 315 b) 213 c) 217
d) 225 e) 215

5. El siguiente gráfico muestra la cantidad de bicicletas montaÑeras y de carrera vendidas por cierta tienda en cada uno de los trimestres del año pasado:



¿Cuáles de las siguientes afirmaciones son verdaderas:

- I. La tienda vendió más bicicletas en el tercer trimestre. ()
 II. La tienda vendió más bicicletas montaÑeras en el cuarto trimestre. ()
 III. La tienda vendió más de 700 bicicletas el año pasado. ()
 a) Solo I b) I y II c) Todas
 d) Solo II e) Solo III

7. Se tiene la siguiente distribución con ancho de clase común. Completa el cuadro y señala cuántos tienen edad menor a 40 años si se cumple que:

$$\frac{f_1}{f_2} = \frac{f_3}{f_4} = \frac{1}{2}$$

Edades	f_i	F_i
[10; >)	k	
[; >)		60
[; >)	4k	
[; 50>)		

- a) 120 b) 140 c) 160
 d) 130 e) 150

6. El siguiente cuadro muestra los ingresos semanales de un grupo de trabajadores de la empresa Germán Export S.A.

Salarios	f_i	F_i	h_i	H_i
[400 – 450>	50			
[450 – 500>				0,40
[500 – 550>	40			
[550 – 600>			0,30	
[600 – 650>				

$n = 200$

Determina el valor de $f_4 + F_2 + h_5 + H_3$.

- a) 150,7 b) 120,7 c) 140,1
 d) 130,7 e) 140,7

8. Construye una tabla de distribuciones de frecuencias con 5 intervalos de clase de ancho común, teniendo en cuenta:

$$f_1 = 27 = f_5$$

$$h_2 = h_4$$

$$h_5 = 0,18$$

$$H_3 = 0,66$$

$$x_3 = 60 = x_2 + 20$$

Determina $\bar{x}$

- a) 60 b) 63 c) 40
 d) 80 e) 56